



Écogramme standard (étages collinéen / submontagnard) avec unités basées sur le système Ellenberg et Klötzli (EK), sous-groupes avec lettre selon le système de la Beratungsgemeinschaft für Umweltfragen (BGU)

	conditions stables				approvisionnement en eau (variation)		éboulis		alluvions	
trop sec pour forêt										
très sec	41	65	40/39	38/64 16	62	16w	62	61	66	
séc	2		35/15	14	14w/15w					
				7e	10	10w				
moyen. frais				7f	9	9w	62	13e	38	29
				7aS	7g	11			25*	28
humide						17		13a	22*	31
				26a 27a	26f 27f	26g		13g	22	43
mouillé										
trop mouillé pour forêt		45		30 44						
	acide, pauvre		moyen		basique, fertile	variations faibles	fortes	éboulis fin	grossier	

étages collinéen / submontagnard

transition vers l'étage montagnard

Hêtraies acidophiles (hêtraies à luzule des forêts)

- 1 Hêtraie à luzule des bois typique

Hêtraies mésophiles

Hêtraies mésophiles (hêtraies à gaillet odorant)

- 6 Hêtraie à gaillet odorant avec luzule des bois
- 7 Hêtraie à gaillet odorant typique
- 8 Hêtraie à millet

(voire aussi annexe 2)

Bibliographie

- Ellenberg H., Klötzli F 1972: Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz. Mitt. der WSL 48, 4: 587-930
- Keller et al. 1998 (Ellenberg und Klötzli 1972): Waldgesellschaften der Schweiz auf floristischer Grundlage. Mitteilungen der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 73, 2: 93-357.
- Clés de détermination cantonales